

1er décembre : Journée mondiale du Sida



Le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) est responsable d'une infection qui attaque le système immunitaire de l'organisme. Le stade le plus avancé de l'infection à VIH est le syndrome d'immunodéficience acquise (sida).

Le VIH cible les globules blancs, affaiblissant le système immunitaire, et rendant les personnes touchées plus susceptibles de contracter certaines maladies comme la tuberculose, des infections et certains cancers.

Le VIH se transmet par les liquides corporels d'une personne infectée, y compris le sang, le lait maternel, le sperme et les sécrétions vaginales. On ne peut pas être infecté par les contacts tels qu'un baiser, une étreinte ou le partage de nourriture. Il peut aussi se transmettre de la mère à l'enfant.

Le VIH peut être traité et évité par le traitement antirétroviral (TAR). Non traité, il peut évoluer vers le sida souvent après de nombreuses années d'évolution.



Au niveau mondial, l'infection à VIH est un problème de santé majeur qui connaît une progression continue dans tous les pays du monde. En 2022, le nombre de personnes vivant avec le VIH était estimé à 39 millions et le nombre de décès liés à l'infection à 630 000 personnes. Le nombre de nouvelles contaminations était lui estimé à plus d'un million de personnes.

Au niveau national, la prévalence de l'infection à VIH est estimée à 190 000 personnes vivant avec le virus. Elle est en constante augmentation depuis le début de l'épidémie ; le nombre annuel de nouvelles contaminations demeurant supérieur au nombre annuel de décès. L'estimation de l'incidence de l'infection dépend à la fois du nombre de nouvelles contaminations dans l'année et du recours au dépistage. Plusieurs méthodes sont utilisées pour réaliser cette estimation. En 2014, Santé publique France estimait¹ l'incidence annuelle du VIH à 5 700 personnes en France. En 2018, l'Inserm estimait² l'incidence annuelle du VIH à près de 6 000 personnes.

Une comparaison des différentes méthodes est en cours afin de choisir la ou les méthode(s) à utiliser préférentiellement pour fournir des estimations actualisées.

En termes de diagnostic, selon les estimations de Santé publique France - LaboVIH³, près de 6 millions de sérologies VIH ont été réalisées en laboratoires de biologie médicale en 2021 en France (reprise après une chute liée à l'épidémie de COVID 19) ; avec un taux de positivité de 1,6 pour 1 000 sérologies réalisées au cours de la même période.

Le nombre réel de découvertes de séropositivité (déclaration obligatoire DO VIH) est estimé après correction des biais de déclarations (exhaustivité insuffisante, données incomplètes, délai de déclaration). En 2021, ce nombre est estimé à près de 5 000 découvertes. Près d'un quart de ces découvertes a eu lieu à un stade précoce et 29 % à un stade avancé de l'infection.

¹ estimation basée sur le nombre de personnes diagnostiquées à l'état d'« infection récente », c'est-à-dire en moyenne dans les 6 mois suivant la contamination.

² estimation basée sur les rétro-calculs à partir des cas diagnostiqués et l'estimation du délai entre contamination et diagnostic.

³ estimation du nombre total de sérologies, remboursées ou non, anonymes ou non, quel que soit le lieu de prélèvement (laboratoire de ville, hôpital, clinique, CeGIDD)



Comité de rédaction :

Natacha NELLER
Sylvie MERLE

Galerie commerciale de
l'Espace Cluny
97233

Schoelcher
0596 61 28 20
[www.ors-
martinique.org](http://www.ors-martinique.org)

OSM
OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ
MARTINIQUE



Au cours de cette période, le nombre de nouveaux diagnostics de sida est estimé à 1 062 personnes. Parmi elles, la majorité ignoraient leur positivité au VIH (62 %).

En Martinique, en termes de surveillance de l'infection, 46 254 personnes ont été dépistées pour le VIH (remboursées par l'Assurance maladie, hors hospitalisation et hors tests gratuits) en 2021; soit un taux brut de 130 dépistages pour 1 000 habitants (contre 59 pour le niveau national). Les plus concernés sont les 25-49 ans avec 244 dépistages pour 1 000 (contre 116 pour le niveau national).




Figure. Taux de dépistages du VIH pour 1 000 habitants (remboursés par l'Assurance maladie, hors hospitalisation et hors tests gratuits)

Source : Géode Santé publique France

Les femmes sont plus concernées que les hommes avec 151 dépistages pour 1 000 femmes contre 105 dépistages pour 1 000 hommes.

En termes de découverte de l'infection, 45 personnes ont été diagnostiquées en 2019 (29 hommes et 16 femmes).

Selon les données de l'Assurance maladie, la prévalence de prise en charge pour VIH ou sida est de 0,4 % en 2021, chez les personnes hospitalisées, ou en ALD, ou suivies en médecine de ville.



Les admissions en affection longue durée pour infection par le VIH (ALD 7) représentent en moyenne 53 nouvelles admissions chaque année sur la période 2019-2021 (37 pour les hommes, 16 pour les femmes); soit un taux standardisé¹ de 17 admissions (25 pour les hommes, 8 pour les femmes) pour 100 000 habitants contre 11 pour 100 000 dans l'Hexagone (respectivement 15 et 8) par an.

Concernant la mortalité liée au sida, on dénombre en moyenne 7 décès par an au cours de la période 2015-2017 (5 pour les hommes, 2 pour les femmes) en Martinique; soit un taux standardisé² de 2 décès pour 100 000 habitants contre 0,4 dans l'Hexagone.

En 2022, le CoreVIH estimait que 250 à 400 martiniquais(es) ignoraient être infectés.

¹ selon l'âge et le sexe, population de référence RP France hexagonale 2020

² selon l'âge et le sexe, population de référence RP France hexagonale 2016



Plus d'information :
[Santé publique France](#)
[Sida info service](#)
[CHU Martinique](#) CeGIDD
 CoreVIH

Action Sida Martinique
 Aides Martinique
www.faitesledepistage.fr



Comité de rédaction :

Natacha NELLER
 Sylvie MERLE

Galerie commerciale de l'Espace Cluny 97233 Schoelcher
 0596 61 28 20
www.ors-martinique.org

